

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Было бы ошибкой полагать, что препарат может излечивать группу симптомов только в той последовательности, в какой они появляются при испытаниях. Очень часто препарат избавляет от такой группы, компоненты которой наблюдались у разных испытуемых, и очень часто в совсем другой последовательности. Тем не менее, опыт показывает, что некоторые группы симптомов появляются вместе. Когда это происходит, то является свидетельством того, что они наиболее характерны для препарата.

Геринг утверждает, что сравнительная ценность сопутствующих симптомов может быть определена следующим образом: если симптомы являются сопутствующими по сути, один является причиной появления другого (слезотечение является следствием общего катарального состояния), тогда эту характеристику надо принять во внимание, но если эти отношения причины и следствия отсутствуют, то это можно игнорировать.

## ЭФФЕКТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРЕПАРАТОМ

Препарат, после того как пациент примет его, может влиять на течение случая следующим образом:

1. Препарат не приводит к каким-либо изменениям — неверен или препарат, или его потенция.
2. Стабильное быстрое улучшение без ухудшений состояния:
  - a) в таких случаях можно сказать, что препарат и потенция полностью соответствуют силе болезни;

б) это также может означать, что болезнь не успелапустить глубокие корни.

N.B.: Также может наблюдаться полное исчезновение симптомов, но если у пациента нет ощущения стабильного постепенного возвращения здоровья, это значит, что препарат не сработал, а наблюдается лишь временное облегчение (паллиативное лечение).

3. Резкое непродолжительное ухудшение, за которым следует быстрое улучшение. В таком случае улучшение обычно продолжительное.
4. Длительное ухудшение и впоследствии медленное улучшение. Обычно это наблюдается у ослабленных пациентов, и опасным было бы слишком скорое повторение препарата.
5. Длительное ухудшение, за которым следует медленное угасание пациента. Такие случаи считаются неизлечимыми. Следует использовать только кратковременно действующие препараты.
6. После приема препарата наблюдается резкое ухудшение состояния. Улучшение, которое наступает потом, очень недолгое по продолжительности, особенно если был дан глубоко действующий препарат. Такие случаи обычно неизлечимы.
7. Быстрое улучшение, за которым наступает ухудшение. Если препарат был подобнейшим, то случай неизлечим, но если препарат соответствует только поверхности, то это, возможно, случай паллиативного действия.
8. Улучшение нормальное по продолжительности, но затем появляется новая группа симптомов. После применения подходящего препарата они исчезают, и новая группа симптомов появляется, но, несмотря на то, что группа за группой симптомов снимаются соответствующими препаратами, состояние пациента устойчиво ухудшается.