

Будьте осторожны при местном применении, потому что *Kali chlor.* ядовит (*Берике*).

Kalium cyanatum. Разрушается под воздействием влаги и кислотных испарений. Не отпускать в разведении ниже 6X. Смертельный яд.

Kalium metallicum¹. Все лекарства этой группы дают ухудшение после любого расстройства жидкостного баланса в организме, особенно после коитуса.

Соли калия не должны применяться, если у пациента лихорадка (*Аллен*).

Kalium phosphoricum. Доктор Морган из Плейфилда, Нью-Джерси, в статье о *Kali phosph.* предупреждал не давать его слишком часто, так как по этой причине может случиться разрыв матки (*The Homeopathic Recorder*, 1934).

Kalmia latifolia. Полезное лекарство при ревматизме, когда он затрагивает грудной отдел. Боли при сердечных заболеваниях *Kalmia* острые, перехватывающие дыхание, пациент почти задыхается. *Kalmia* особенно полезна, если подагра или ревматизм от суставов перешли на сердце, в особенности после наружного применения. Если вы назначали *Arnica* внутрь и наносили ее местно, и она была показанным лекарством, в этом случае не будет опасности перехода болезни вглубь. Но если кто-либо нанесет настойку *Aconitum* на пораженные суставы, не исключено, что воспаление перекинется на жизненно важные органы (*Фаррингтон*).

Lachesis². Требуется осторожность при назначении в случае острых болезней, потому что *Lachesis* почти всегда сопровождается ухудшением состояния (*Мэрроу*).

¹ Пациенты, принимавшие любое лекарство из группы *Kalium*, не должны вступать в половые сношения в течение недели или около того, в зависимости от принятой потенции и длительности ее действия. — *Прим. авт.*

² См. также *Aspenicum*. — *Прим. авт.*

Неуместное повторение может привести к постоянному нежелательному психическому состоянию.

Lachesis не часто требуется для лечения диареи. В хронических случаях и в ходе развития других острых заболеваний на него могут указать сопутствующие симптомы (*Белл*).

Lachesis нельзя повторять слишком часто. Если он точно показан, то нужно позволить одной дозе исчерпать свое действие (*Берике*).

Lachesis после *Nitricum acidum* действует как яд, но *Nitricum acidum* после *Lachesis* дополняет его.

Ledum. Хинная корка, назначенная против слабости, вызванной *Ledum*, очень вредна (*Ганеман*).

Lilium tigrinum. Если менструальные выделения пациентки продолжают в положении лежа, то это служит противопоказанием к *Lilium tigrinum*; бели у этого лекарства коричневатые, мучительные и зачастую зловонные (*Роуэл*).

Lobelia inflata. Лечение при помощи *Lobelia* всегда должно начинаться с одной дозы, если позволяют симптомы, поскольку в некоторых случаях она вызывает сильную депрессию (*Кларк*).

Lycopodium. Редко бывает целесообразным начинать лечение хронических заболеваний с этого средства, пока нет ясных указаний на него. Сначала лучше дать другое противосорное лекарство (*Аллен*).

Lycopodium является средством глубокого и длительного действия, и его не следует повторять, если наметилось улучшение.

Sulphur хорошо действует, если дать его после *Lycopodium*, но не наоборот. Прекрасное лекарство при язве двенадцатиперстной кишки, сопровождаемой изжогой, отрыжкой и болью или давлением в эпигастрии или в правом подреберье. Наиболее успешно можно использовать его в чередовании с кишечным нозодом *Dysentery co.*, но остерегайтесь использовать *Lycopodium* в потенциях намного выше, чем 12C в случае сильной боли, иначе вы можете ускорить перфорацию (*Ботт*).