

- Неделя 2:** *Carcinosinum* 200С – ежедневно, методом-плюс. Кроме того, *Arsenicum iodatum* 6Х – два раза в день. Разумеется, с первого дня лечения пациенту пришлось оставить привычку жевать табак, так же, как недели 1–2.
- Недели 3–24:** Язва полностью затянулась, оба увеличенных лимфоузла вернулись к обычным размерам.
- Месяцы 7–9:** так же, как недели 1–2.
- Месяцы 10–18:** *Aurum muriaticum* 1М и *Carcinosinum* 1М – чередуя их через неделю, методом сплит-дозы. *Arsenicum iodatum* 6Х – дважды в день, в течение всего периода лечения.

В течение четырех лет пациент получал *Aurum muriaticum* 1М или *Carcinosinum* 1М, ежемесячно чередуя их, методом сплит-дозы, и теперь совершенно здоров.

#### Комментарии

О выборе *Aurum muriaticum* см. главу 2.

+ На более поздних стадиях рака (III и IV стадии), когда первичный очаг был прооперирован, но удаление оказалось успешным лишь частично, либо когда метастазы широко распространились в лимфатические узлы или в соседние органы, либо при рецидиве рака – процедура остается той же, но применяются более серьезные меры: метод-плюс и метод сплит-дозы используются в течение более длительного времени.

#### СЛУЧАЙ 6

Июнь 1993 г.

Женщина, 35 лет. Обратилась по поводу новообразования в правом яичнике. Жалобы на крайнее утомление, вздутие. С подросткового возраста страдает от болезненных менструаций.

Пациентка согласилась на операцию, и большая часть опухоли (но не вся) была удалена вместе с 30 брызговыми узлами, из которых 13 оказались злокачественными. Печень и селезенка не бы-

ли поражены. Результаты биопсии: аденокарцинома яичника, III стадия. Были рекомендованы химио- и радиотерапия, но пациентка от них отказалась.

#### Назначения

- Неделя 1:** *Viburnum prunifolium* 200С – ежедневно, методом-плюс.
- Неделя 2:** *Carcinosinum* 200С – ежедневно, методом-плюс.
- Недели 3–24:** так же, как недели 1–2.
- Самочувствие пациентки постепенно улучшается, появляются силы.

*КТГ – отсутствие патологических изменений.*

**Месяцы 7–12:** так же, как недели 1–2, но в потенции 1М. Состояние пациентки продолжает улучшаться.

*КТГ – метастазы по-прежнему отсутствуют.*

**Месяцы 13–18:** так же, как месяцы 7–12.

*КТГ – метастазы по-прежнему отсутствуют.*

**Месяцы 19–24:** так же, как месяцы 7–12, но прием один раз в две недели – методом сплит-дозы.

**Месяцы 25–48:** так же, как месяцы 19–24, но лекарства чередуются через месяц.

Лечение закончено, за исключением периодического приема конституциональных лекарств, которые чередуются с приемом *Carcinosinum*. Спустя семь лет: женщина здоровья, и периодически проводимая КТГ показывает, что все в порядке.

#### Комментарии

*Viburnum prunifolium* зарекомендовал себя в качестве эффективного средства при раке яичников в тех случаях, когда в анамнезе имеется упоминание о выраженной дисменорее.

Более подробные рекомендации относительно гомеопатического лечения пациента сразу после использования аллотерапии методов западной медицины или в сочетании с ними см. в главе 8.